

檔 號：
保存年限：

中華民國中醫師公會全國聯合會 書函

會址：新北市板橋區民生路一段33號11樓之2
電話：(02)2959-4939
傳真：(02)2959-2499
E-mail：twtm09@gmail.com
承辦人：王逸年 分機：17

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年6月10日
發文字號：(111)全聯醫總富字第1794號
速 別：
附 件：公文暨附件影本，乙份

主 旨：進行視訊診療時，請利用健保醫療資訊雲端系統查詢個案使用「公費臺灣清冠一號藥品費用」之紀錄，並確認個案是否正在服用口服抗病毒藥物或臺灣清冠一號，以避免重複用藥浪費資源，敦請貴會轉知所屬會員，請察照辦理。

說 明：

- 一、依衛生福利部中央健康保險署民國111年6月7日健保醫字第1110661365號函辦理。
- 二、來文暨相關附件等公告影本，請至以下網址或掃描QR-code
瀏覽查閱：<http://twtm.1655.com.tw/new.php?cat=1&id=2844>

中醫全聯會
校對章(四)


正本：各縣市中醫師公會、中醫門診醫療服務審查執行會六區分會
副本：

中華民國中醫師公會全國聯合會



正本

檔 號
保存年限



衛生福利部中央健康保險署 函

220



新北市板橋區民生路一段33號11樓之2

地址：10634 臺北市大安區信義路三段140號

聯絡人：蔡月媚

聯絡電話：02-27065866 分機：2640

傳真：02-27069043

電子郵件：A110172@nhi.gov.tw

受文者：中華民國中醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國111年6月7日

發文字號：健保醫字第1110661365號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：有關中醫師視訊診療時，請利用健保醫療資訊雲端系統查詢個案使用「公費臺灣清冠一號藥品費用」之紀錄，並確認個案是否正在服用口服抗病毒藥物或臺灣清冠一號，以避免重複用藥浪費資源，請轉知所屬會員，請查照。

說明：

一、依衛生福利部111年5月5日衛部中字第1111860576A號函辦理(諒達)。

二、「健保醫療資訊雲端查詢系統(首頁版)」及「因應天災及緊急醫療查詢作業」COVID-19用藥查詢及藥品交互作用線上查詢功能，說明如下：

(一)為提升病人用藥安全，本署建置COVID-19口服抗病毒藥物及清冠一號領用情形查詢：

1、因應天災及緊急醫療查詢作業：

(1)「雲端藥歷」頁籤收載病人使用COVID-19抗病毒口服用藥Paxlovid及Molnupiravir明細資料，並置頂呈現。

(2)「中醫用藥」頁籤新增臺灣清冠一號藥品領用情形，並置頂呈現。

2、健保醫療資訊雲端查詢系統（三卡認證）：亦可查詢上述「雲端藥歷」及「中醫用藥」頁籤之資料。

(二)另因應院所視訊診療需要，除原有的「藥品交互作用暨過敏藥物主動提示功能（API）」外，於「因應天災及緊急醫療查詢作業」及「健保醫療資訊雲端查詢系統」新增「藥品交互作用線上查詢功能」。

(三)前述功能之說明及示意圖(附件)。

三、醫師視訊診療時，經由機構管理者授權所屬醫師運用「因應天災及緊急醫療查詢作業」，以醫事機構安全模組卡及醫師卡認證後，輸入病人身分證號查詢個案近期就醫紀錄。

四、請貴會轉知所屬會員及中醫診所，配合24小時內上傳健保卡就醫資料，並應依醫療需要，善用健保醫療資訊雲端系統查詢個案就醫紀錄。

五、副本抄送本署各分區業務組(請協助轉知轄區特約醫事服務機構)。

正本：中華民國中醫師公會全國聯合會

副本：衛生福利部、本署醫審及藥材組、本署各分區業務組

署長李伯璋

視訊診療一因應天災及緊急醫療查詢作業查詢COVID-19用藥(中藥)

■ 「中醫用藥」頁籤：公費臺灣清冠一號領用情形表(111.05.25新增上線)

■ 健保醫療資訊雲端查詢系統「中醫用藥」頁籤亦同步新增



因應天災及緊急醫療查詢作業

1. 本查詢作業以查詢視訊診療、社區藥局送藥到宅專案(COVID-19疫情期間)或緊急醫療病患(檢體分類第一至三級病患)資料為限。
2. 請遵守個人資料保護及隱私保護規範。
3. 如需獲取病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。

1 完成認證進入「因應天災及緊急醫療查詢作業」
輸入病人身分證號，點擊「查詢」

2 點選「中醫用藥」頁籤

身分證號 查詢

雲端藥歷 特定制劑藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 中醫用藥

此病人公費臺灣清冠一號藥品領用情形：

來源 日期
3832051503 111/05/21
廬山風澤中

3 清冠一號領用院所及日期置頂呈現

基準方名	全部	藥品代碼	全部	效能名稱	全部	就醫區間	近六個月內	顯示欄位設定	查詢	清除	餘藥查詢	藥品交互作用查詢	圖形化查詢畫面
序號	1	來源	亞洲大學附 門診	主診斷	慢性骨髓性白血病，BCR/ABL陽性，未達到緩解 C9210	給藥日數	14	慢速籤	就醫(調劑)日期	111/05/25	慢速籤領藥日	就醫序號	0189

新增「藥品交互作用」線上查詢功能



- 藥品交互作用暨過敏藥物提示功能(API) (111.04.21上線)
- 院所HIS系統需完成系統介接，使用時需完成三卡認證
- 藥品交互作用線上查詢功能 (111.05.25新增上線)-不須介接HIS系統
- 「因應天災及緊急醫療查詢作業」及「健保醫療資訊雲端查詢系統」均可使用
- 進入「因應天災及緊急醫療查詢作業」或「健保醫療資訊雲端查詢系統」，完成病人資料查詢

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 過敏藥 中醫用藥

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
 4、持續性病連續處方箋請調，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次請調。

點選「藥品交互作用查詢」按鈕
 一以西藥查詢：請至「雲端藥歷」頁籤
 一以中藥查詢：請至「中醫用藥」頁籤

2 餘藥

就醫區 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數 慢性病連續處方箋專區

顯示欄位設定 查詢 清除

複方註記

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC3名稱	ATC5名稱	成分名稱	清除	查詢	顯示欄位設定	複方註記	成分名稱	就醫區	餘藥	藥品名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量
1	高雄醫學大 急診 130205001 U071	嚴重特殊傳染性肺炎，確診	抗病毒藥 (Antiviralsfor system icase)	Other Antivirals	Y	Nirmatrelvir ; Ritonavir	XCOVD0001	PAXLOVID	5	10								

「藥品交互作用」線上查詢功能—以查詢PAXLOVID為例(1/2)



藥品交互作用查詢

1 點選「藥品交互作用查詢」按鈕，會開啟「藥品交互作用查詢」視窗



https://medvpn.nhi.gov.tw/IMQE0000/IMQE0008S21.aspx

藥品交互作用查詢

藥品查詢
查詢結果
資料說明

西藥查詢

PAXLO

PAXLOVID

請輸入西藥藥品代碼(健保碼)

或

請輸入西藥ATC碼

3 點擊後會列入下方綠色方框(擬查詢之藥品)

至多選擇10項藥品

至多可選擇10項藥品

2 可輸入西藥藥品名稱(PAXLOVID)、藥品代碼(XCOVID0001)或藥品ATC碼進行查詢，每個欄位均有模糊比對功能

比對交互作用

西藥查詢

藥品查詢
查詢結果
資料說明

請輸入西藥藥品名稱

或

請輸入西藥藥品代碼(健保碼)

至多選擇10項藥品

PAXLOVID X

4 可點擊紅色「X」刪除

比對交互作用

5 選好後，點擊「比對交互作用」按鈕開始比對

「藥品交互作用」線上查詢功能—以查詢PAXLOVID為例(2/2)



- 6 點選「比對交互作用」後會跳轉至「查詢結果」
(如需再查詢其他藥品交互作用，請於左側列表切換回「藥品查詢」)

藥品交互作用查詢

交互作用比對結果

藥品查詢

查詢結果

資料說明

7 查詢結果會顯示於下方方框內

- 以西藥查詢時，會同時比對「西藥對西藥」以及「西藥對中藥」之交互作用
- 以中藥查詢時，比對「中藥對西藥」之交互作用

西藥對西藥

西藥對中藥

查詢藥品 ATC7名稱	比對藥品 ATC7名稱	開藥院所	開藥日期	交互作用結果	機轉	處置方式	參考文獻 (資料庫/PMID)
Paxlovid(nirm atrelvir\Riton avir)	Diltiazem	亞東醫院	111/04/07	增加Diltiazem濃度	-	與 Paxlovid併用時可能需要降低劑量	
Paxlovid(nirm atrelvir\Riton avir)	Diltiazem	亞東醫院	111/05/05	增加Diltiazem濃度	-	與 Paxlovid併用時可能需要降低劑量	

交互作用比對結果

8 查無資料時，

於方框內顯示「查無資料！」

西藥對西藥

西藥對中藥

查無資料！

補充 以中藥查詢之查詢結果示意圖

中藥對西藥

查詢藥品 臺灣方名	比對藥品 ATC7名稱	開藥院所	開藥日期	交互作用結果	機轉	處置方式	參考文獻 (資料庫/PMID)
丹參	Apixaban	亞東醫院	111/04/07	增加抗凝血作用，可能有不確定的出血風險。	丹參與 Apixaban 併用時，可能加強抗凝血作用，或抗血栓形成。	併用時，應密切注意是否有出血或其他藥物副作用情形。	
丹參	Apixaban	亞東醫院	111/05/05	增加抗凝血作用，可能有不確定的出血風險。	丹參與 Apixaban 併用時，可能加強抗凝血作用，或抗血栓形成。	併用時，應密切注意是否有出血或其他藥物副作用情形。	5